

(五) 类型:

1. 依据病因不同

① 弥漫性颅内压增高: 多由于颅腔狭小或全面性脑实质的体积增加引起
如弥漫性脑膜炎, 弥漫性脑水肿, 脑积水

② 局灶性颅内压增高: 多因颅内有局限的扩张性病变引起: 颅内肿瘤

2. 病情发展程度

① 急性颅内压增高: 颅内出血, 高血压脑内出血

② 亚急性颅内压增高: 颅内恶性肿瘤

③ 慢性颅内压增高: 颅内良性肿瘤

详细的讲解

二. 临床表现 ***

1. 头痛: 最常见的症状之一, 程度不同, 以早晨或晚间较重, 部位多发生于额部及颞部, 可从颈枕部向前放射至眼眶。

2. 呕吐: 当头痛剧烈时, 可伴有恶心和呕吐。呕吐呈喷射性, 易发生于饭后有时可导致水电解质紊乱和体重减轻。

3. 视神经乳头水肿 这是颅内压增高的主要客观体征之一。表现为视神经乳头充血, 边缘模糊不清, 中央凹陷消失, 视盘隆起, 静脉怒张。

4. 意识障碍及生命体征变化, 疾病初期可出现嗜睡、反应迟钝。

病例 一名男性, 30岁, 病程4个月, 头痛发病, 入院前出现左侧肢体无力和呕吐
入院检查, 意识清, 眼底视乳头水肿, 左上下肢肌力IV级, 腱反射左侧活跃
病理征(+).

问: ① 该病人的最可能的临床诊断是什么?

② 如何治疗?