

(六) 脑疝的急救和护理

1. 快速静脉输注20%甘露醇200-400ml, 利用留置导管以观察脱水效果
2. 保持呼吸道通畅并给氧, 必要时气管插管
3. 密切观察病人的生命体征.

(七) 脑室外引流的护理

1. 引流管妥善固定, 遵循无菌操作原则, 引流瓶高于侧脑室平面10-15cm.
2. 保持引流是通畅
3. 注意引流的速度和量
4. 严格执行无菌操作原则
5. 观察和记录引流量
6. 拔管指征

[课堂小结] 通过该课的教学, 重点要求学生掌握好颅内压增高病人的临床表现, 主要护理措施.

[课堂练习]

1. 防治脑水肿, 应用最广, 效果较好的脱水剂: (B)
A. 50%葡萄糖溶液 B. 20%甘露醇溶液 C. 25%山梨醇溶液
D. 30%尿素溶液 E. 浓缩血清白蛋白
2. 关于颅内压增高成人的输液护理, 以下不正确的是: (D)
A. 输液总量1500-2000ml/日 B. 钾盐不超过500ml/日
C. 尿量不少于600ml/日 D. 输液速度控制在40滴/分
3. 颅内压增高的主要治疗措施应包括: ADE
A. 病因治疗 B. 大量补入含钠液体
C. 优先镇静止痛 D. 脱水治疗 E. 脱水与补钠并举.
4. 颅内压增高三联征 头痛, 呕吐, 视神经乳头水肿.